

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«Сургутский государственный университет»**

**Медицинский институт
Кафедра внутренних болезней**

**Демонстрационная версия экзаменационного задания
по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина
направленность Внутренние болезни**

1. Соблюдение врачебной тайны необходимо для: защиты внутреннего мира человека, его автономии; защиты социальных и экономических интересов личности; создания основы доверительности и откровенности взаимоотношений “врач-пациент”; поддержания престижа медицинской профессии *(ответьте, верно или неверно указанное утверждение)*
2. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации); амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника; в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение) *(ответьте, верно или неверно указанное утверждение)*
3. Диагноз гипертонической болезни 3 стадии убедителен только при: АД диастолическое выше 115 мм рт. ст; сочетание ИБС с ЦВБ; сочетание ИБС с ХПН *(ответьте, верно или неверно указанное утверждение)*
4. Подтверждением развития первичного неосложненного инфаркта миокарда у больного с типичным болевым синдромом может быть *(выберите правильный ответ)*
 - а) Ослабление 1 тона на верхушке
 - б) Ритм галопа
 - в) Появление единичных экстрасистол
 - г) Все неверно
 - д) Все верно
5. Понятие Хронический гастрит включает в себя клинические проявления (синдром диспепсии, постпрандиальные расстройства) и морфологические изменения в слизистой оболочке желудка (воспаление - степень, атрофия – стадия, кишечная метаплазия) *(ответьте, верно или неверно указанное утверждение)*
6. Профилактикой перехода острого гломерулонефрита в хронический является *(выберите правильный ответ)*
 - а) Постельный режим
 - б) Бессолевая диета
 - в) Антибактериальная терапия
 - г) Все перечисленные
 - д) Все неверно
 - е) Все верно

7. Железодефицитная анемия может развиваться при следующих состояниях: операции на желудке; рецидивирующие кровопотери; хронические заболевания кишечника; беременность *(ответьте, верно или неверно указанное утверждение)*

8. Какие осложнения язвенной болезни встречаются при язвенной болезни *(выберите правильный ответ)*

- а) Кровотечение
- б) Перфорация
- в) Пенетрация
- г) Стеноз
- д) Все неверно
- е) Все верно

9. Инфаркт миокарда может протекать в клинических формах *(выберите правильный ответ)*

- а) ангинозная
- б) астматическая
- в) абдоминальная
- г) церебральная
- д) аритмическая
- е) безболевая
- ж) все верно
- з) все неверно

10. Причиной механической желтухи является: 1) холедохолитиаз; 2) структура Фатерова соска; 3) рак головки поджелудочной железы *(ответьте, верно или неверно указанное утверждение)*

11. Для оценки степени тяжести пациента при заболевании необходимо определить: 1) субъективную симптоматику и физикальные данные (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 2) оценкой состояния функций жизненно-важных органов; 3) лабораторные и инструментальные данные *(ответьте, верно или неверно указанное утверждение)*

12. Бронхиальная обструкция при бронхиальной астме является обратимой *(ответьте, верно или неверно указанное утверждение)*

13. При проведении медико-социальных исследований не применяются следующие методы *(выберите правильные ответы)*

- а) Исторический
- б) Статистический
- в) Экспериментальный
- г) Клинико-эпидемиологический
- д) Экономический
- е) Социологический
- ж) Лабораторный

14. Высокотехнологичная медицинская помощь может оказываться в следующих условиях *(выберите правильные ответы)*

- а) Вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации)
- б) Амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского

- наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника
- в) В дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения)
 - г) Стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение)
 - д) В центрах оказания специализированной медицинской помощи по направлениям

15. Важнейшими критериями синдрома системной воспалительной реакции являются *(выберите правильный ответ)*

- а) Фебрильная лихорадка или гипотермия
- б) Тахикардия
- в) Тахипноэ или гипервентиляция
- г) Лейкоцитоз или лейкопения
- д) Нейтрофиллез
- е) Ничего из перечисленного
- ж) Все перечисленное

16. Важнейшим диагностическим лабораторным критерием синдрома системной воспалительной реакции (бактериального сепсиса) является *(выберите правильные ответы)*

- а) Лейкоцитоз или лейкопения
- б) Повышение СОЭ
- в) Нейтрофиллез
- г) Гиперфибриногенемия, повышение СРБ
- д) Положительный прокальцитонинный тест
- е) Положительная гемокультура

17. Лихорадка, сочетающаяся с лимфаденопатией требует исключения в первую очередь *(выберите правильные ответы)*

- а) Сепсиса
- б) Инфекционного эндокардита
- в) ВИЧ/СПИДа
- г) Вирусного гепатита
- д) Саркоидоза
- е) Туберкулеза

18. Диагноз саркоидоза устанавливают на основании *(выберите правильный ответ)*

- а) Лихорадки
- б) Торакальгий, дискомфорта в груди
- в) Суставного синдрома
- г) Кашля, одышки
- д) Слабости, утомляемости
- е) Лимфаденопатии
- ж) Саркоидной реакцией в тканях – наличия неспецифических гранулем
- з) Все неверно
- и) Всех перечисленных признаков, но с гистологической верификацией

19. Какие заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки могут быть связаны с *Helicobacter pylori* *(выберите правильный ответ)*

- а) Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
- б) Хронический гастрит

- в) Рак желудка
- г) МАЛТома
- д) Все перечисленные
- е) Ничего из перечисленных

20. Если врач СМП ввел больному с гипертоническим кризом 5 мл 1% дибазола внутривенно и успешно купировал криз, о каком варианте криза следует думать (*выберите правильный ответ*)

- а) Гипокинетическом
- б) Гиперкинетическом
- в) Эукинетическом
- г) Нельзя решить
- д) О любом варианте криза

21. Какие из перечисленных эффектов не характерны для бета-блокаторов (*выберите правильный ответ*)

- а) Снимают спазм коронарных артерий
- б) Урежают ЧСС
- в) Обладают антиаритмическим действием
- г) Снижают АД
- д) Замедление а-в проводимости

22. Для эффектов нитроглицерина не характерно (*выберите правильный ответ*)

- а) Снятие спазма коронарных артерий
- б) Снижение числа сердечных сокращений
- в) Снижение преднагрузки
- г) Антиагрегантный эффект
- д) Уменьшение постнагрузки

23. Для клиники острого интерстициального отека легких (кардиальной астмы) не характерно (*выберите правильный ответ*)

- а) Ортопноэ
- б) Тахипноэ до 40-60 в 1 минуту
- в) Диффузный цианоз
- г) Разнокалиберные влажные хрипы над всей поверхностью легких
- д) Сухой непродуктивный кашель

24. Какие из нижеперечисленных данных не характерны для митрального стеноза (*выберите правильный ответ*)

- а) Акроцианоз
- б) Отсутствие верхушечного толчка
- в) Эпигастральная пульсация, обусловленная правым желудочком
- г) Мерцательная аритмия
- д) Низкое (ниже 40 мм рт.ст.) диастолическое давление

25. Диастолический шум отсутствует при (*выберите правильный ответ*)

- а) Митральной недостаточности
- б) Аортальной недостаточности
- в) Недостаточности клапана легочной артерии
- г) Митральном стенозе
- д) Трикуспидальном стенозе

26. Внезапное начало приступа с неприятных ощущений в сердце, сердцебиения с частотой сердечных сокращений 180 в 1 минуту, головокружения, потливости, обнаружение на ЭКГ частого правильного ритма, неизменного комплекса QRS, отсутствие зубца Р и внезапное окончание приступа характерно для (*выберите правильный ответ*)

- а) Синусовой тахикардии
- б) Частой экстрасистолии
- в) Наджелудочковой пароксизмальной тахикардии
- г) Пароксизмальной мерцательной аритмии
- д) Желудочковой пароксизмальной тахикардии

27. Неполная АВ блокада (АВ блокада II степени) с периодами Самойлова-Венкебаха) характеризуется (*выберите правильный ответ*)

- а) Увеличением интервала Р-Q более 0,22 сек
- б) Постепенным увеличением интервала Р-Q в последующих циклах с периодическим выпадением зубца Р
- в) Нормальным интервалом Р-Q и периодическим выпадением зубца Р
- г) Нормальным интервалом Р-Q и периодическим выпадением (исчезновением) QRS
- д) Постепенным увеличением Р-Q в следующих циклах и периодическим выпадением QRS

28. В патогенезе инфаркта миокарда без зубца Q (субэндокардиального, мелкоочагового) играют роль все перечисленные факторы, кроме (*выберите правильный ответ*)

- а) Преходящее нарушение кровотока вследствие агрегации тромбоцитов, образования рыхлых сгустков в коронарной артерии
- б) Тромбоз крупной коронарной артерии
- в) Несоответствие коронарного кровотока потребностям миокарда на фоне стенозирующего коронароспазма
- г) Развитая сеть коллатералей в бассейне артерии, ответственной за развитие инфаркта миокарда
- д) Анатомические особенности кровоснабжения субэндокардиальных слоев Миокарда

29. Выберите наиболее значимый (из приведенных) этиологический фактор хронического кальцифицирующего панкреатита (*выберите правильный ответ*)

- а) Нерегулярный прием пищи
- б) Курение
- в) Алкоголь
- г) Алиментарное ожирение
- д) Гипертиреоз

30. В патогенезе пиелонефрита ведущую роль играет (*выберите правильный ответ*)

- а) Генетический фактор
- б) Вирулентность возбудителя
- в) Нарушение уродинамики
- г) Неадекватная антибактериальная терапия
- д) Снижение иммунитета

31. Пикфлоуметрия позволяет определить (*выберите правильный ответ*)

- а) Жизненную емкость легких
- б) Скорость форсированного выдоха

- в) Содержание углекислоты в выдыхаемом воздухе
- г) Процент насыщения кислородом
- д) Остаточную емкость легких

32. Наиболее характерным этиологическим возбудителем пневмонии при ВИЧ инфекции являются (*выберите правильные ответы*)

- а) Пневмоцисты
- б) Стафилококки
- в) Грибы рода *Candida*
- г) Вирусы герпеса
- д) Стрептококки

33. ОРВИ может осложняться (*выберите правильные ответы*)

- а) Очаговым пневмосклерозом
- б) Бронхитом
- в) Экссудативным плевритом
- г) Бронхоэктазами
- д) Пневмонией

34. Сухие свистящие хрипы выслушиваются при (*выберите правильные ответы*)

- а) Бронхиальной астме
- б) Бронхите
- в) Бронхиолите
- г) Бронхоэктатической болезни
- д) Пневмонии

35. Назовите вирусы, которые являются облигатно гепатотропными (*выберите правильные ответы*)

- а) ВГА
- б) ВГВ
- в) Вирус Эпштейн-Барра
- г) Вирус простого герпеса
- д) ВГС

36. Пути передачи вируса гепатита В и С являются (*выберите правильные ответы*)

- а) Фекально-оральный
- б) Гемоконтактный при потреблении инъекционных наркотиков
- в) Половой
- г) Гемоконтактный при медицинских вмешательствах
- д) Вертикальный
- е) Гемоконтактный при контакте с микрочастицами крови в быту

37. При развитии геморрагического синдрома у больных с острой печеночной недостаточностью какие препараты используются (*выберите правильные ответы*)

- а) УМАНА-комплекс
- б) Викасол
- в) Свежезамороженная плазма
- г) Криопреципитат

д) Гемотрансфузии

38. Укажите важнейший дифференциально-диагностический признак цирроза печени (выберите правильный ответ)

- а) Дистрофия гепатоцитов
- б) Расширение портальных трактов
- в) Узловая регенерация печеночной ткани, ложные дольки
- г) Соединительнотканые междолевые септы
- д) Ступенчатые некрозы, воспалительная инфильтрация

39. Врач стационара должен уметь выделить синдромокомплексы при заболевании на основе (выберите правильные ответы)

- 1). Субъективных признаков - характерных жалоб и анамнез
 - 2). Объективных признаков - данных физикального обследования пациента
 - 3). Параметров лабораторных исследований
 - 4). Параметров инструментальных методов обследования
- а) верно если правильны ответы 1, 2, 3
 - б) верно если правильны ответы 1, 3
 - в) верно если правильны ответы 2, 4
 - г) верно если правильный ответ 4

40. Для оценки степени тяжести пациента – в критерии степени тяжести при заболевании врачу необходимо оценивать (выберите правильные ответы)

- 1). Сознание больного
 - 2). Температуру тела
 - 3). Положение тела, состояние жизненно-важных органов по физикальным данным (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация – в первую очередь оценить ЧСС, ЧДД, АД, состояние кожных покровов и слизистых оболочек)
 - 4). Результаты лабораторных данных (включенных в шкалы оценки тяжести состояния больного SAPS, APACHE I-II-III, SOFA, MODS, САК, ASA, MPI, ПИР и др.)
- а) верно если правильны ответы 1, 2, 3
 - б) верно если правильны ответы 1, 3
 - в) верно если правильны ответы 2, 4
 - г) верно если правильный ответ 4

41. В своей работе сегодня для формулирования диагноза, маршрутизации больного, выбора тактики лечения и ведения больного врач должен опираться на (выберите правильные ответы)

- 1). МКБ-Х пересмотр
 - 2). Клинические классификации
 - 3). Клинические рекомендации
 - 4). Клинические протоколы (стандарты) по нозологиям
- а) верно если правильны ответы 1, 2, 3
 - б) верно если правильны ответы 1, 3
 - в) верно если правильны ответы 2, 4
 - г) верно если правильный ответ 4

42. Подтверждением развития первичного неосложненного инфаркта миокарда у больного с типичным болевым синдромом является (выберите правильные ответы)

- 1) Ослабление 1 тона на верхушке

- 2) Тахикардия, гипотония
 - 3) Ритм галопа
 - 4) Возникшие нарушения ритма сердца - появление единичных экстрасистол
 - 5) Резкая слабость, холодный липкий пот
 - 6) Появление чувства нехватки воздуха, инспираторной одышки
- а) верно 1, 2, 3
 - б) верно 2, 3, 5
 - в) верно 1, 2, 6
 - г) верно 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - д) верно 1, 4, 6

43. Какие клинические формы ИБС сегодня выделяются согласно современной классификации (*выберите правильные ответы*)

- 1) Внезапная коронарная смерть (первичная остановка сердца)
 - 2) Стенокардия
 - 3) Инфаркт миокарда
 - 4) Кардиосклероз постинфарктный
 - 5) Недостаточность кровообращения (ишемическая кардиопатия)
 - 6) Нарушение сердечного ритма
 - 7) Безболевая («немая») ишемия
 - 8) Микроваскулярная (дистальная) ИБС
 - 9) Новые ишемические синдромы («оглушение» миокарда, «гибернация» миокарда, прекондиционирование миокарда)
- а) верно 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - б) верно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - в) верно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

44. Назовите признаки, которые могут наблюдаться при хроническом вирусном гепатите В и/или С (*выберите правильный ответ*)

- а) гепатомегалия
- б) спленомегалия
- в) цитолиз – повышение активности АЛТ, АСТ
- г) мезенхимальное воспаление – повышение тимоловой пробы
- д) холестаза – зуд кожи, повышение активности ГГТП, ЩФ
- е) астенизация, потеря массы тела, расстройство сна
- ж) гипербилирубинемия с соотношением фракций билирубина 1:1
- з) выделение маркеров HBV (HBsAg, HBeAb, HBsAb, HBscore Ab в соответствии со стадией) и HCV (HCV Ab, HCV Ab core, NS3-4-5) инфекции при определении методом ИФА
- л) положительные пробы крови на РНК HCV и ДНК HBV определяемые методом ПЦР
- м) кожный синдром - телеангиэктазии
- н) все перечисленное
- о) ничего из перечисленного

45. Гендерно-возрастные особенности при хроническом холецистите и при ЖКБ (*выберите правильные ответы*)

- 1). Мужчины
- 2). Женщины
- 3). Любого возраст
- 4). Молодой возраст

- 5). Возраст значения не имеет
б). Лица зрелого и пожилого возраста
- а) верно 1, 3
 - б) верно 1, 4
 - в) верно 1, 5
 - г) верно 1, 6
 - д) верно 2, 3
 - е) верно 2, 4
 - ж) верно 2, 5
 - з) верно 2, 6

46. Этиологические факторы хронического холецистита/холангита (*выберите правильный ответ*)

- а) бактерии
- б) лямблии
- в) вирусы
- г) токсические факторы
- д) аллергические факторы
- е) все перечисленное верно**
- ж) ни одного из перечисленных

47. Причиной механической желтухи являются (*выберите правильные ответы*)

- 1) ЖКБ, холедохолитиаз
 - 2) Стриктура Фатерова соска
 - 3) Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки
 - 4) Рак головки поджелудочной железы
 - 5) Хронический гастрит
 - 6) Дивертикулярная болезнь толстой кишки
 - 7) Функциональное билиарное расстройство сфинктера Одди
- а) верно 1, 2, 6, 7
 - б) верно 2, 3, 5
 - в) верно 3, 4, 6, 7
 - г) верно 1, 2, 4

48. Диагноз псевдомембранозный колит устанавливают на основании признаков (*выберите правильные ответы*)

- 1). Типичный анамнез (симптомы развиваются остро)
 - 2). Острая диарея обусловлена применением антибиотиков
 - 3). Острая диарея носит органический характер (дефекации ночью, потеря массы тела, субфебрилитет, положительные белки острой фазы, изменения гемограммы)
 - 4). Выделение в кале микробиологическим методом *Clostridium difficile*
 - 5). Выделение микробиологическим методом возбудителя острой кишечной инфекции
 - 6). Наличие «псевдолипидных» мембран при эндоскопическом исследовании толстой кишки
- а) верно 1, 2, 3, 4, 6
 - б) верно 1, 2, 3, 4, 5
 - в) верно 1, 2, 3, 4, 5, 6

49. Варианты синдрома желтухи при хроническом гепатите, циррозе печени, при остром гепатите (*выберите правильный ответ*)

- а) надпеченочная
- б) печеночная
- в) подпеченочная
- г) может быть любой вариант

50. Асцит при циррозе печени образуется вследствие (*выберите правильные ответы*)

- 1). Потери белка с мочой, мокротой
- 2). Вторичного гиперальдостеронизма
- 3). Печеночно-клеточной недостаточности с гипоальбуминемией
- 4). Портальной гипертензии
- 5). Застойной сердечной недостаточности
- 6). Избыточного поступления жидкости в организм

- а) верно 1, 2, 5,
- б) верно 1, 3, 5
- в) верно 2, 3, 6
- г) верно 5, 1, 6
- д) верно 4, 3, 2
- е) верно 1, 4, 6